

Soupis registrovaných veterinárních léčivých přípravků k ošetření včel proti varroáze

Název (účinná látka)	Dávka účinné látky na jedno ošetření	Léková forma	Prodej	Doporučené období použití	Použití v období snůšky medu určeného pro lidskou spotřebu	Některé pokyny výrobce z hlediska použití
Apiguard (thymol)	12 500 mg	Gel	vyhrazený	celoročně až podzim jaro	ne	Přípravek nepoužívejte, jestliže je očekávaná maximální denní teplota během aplikace přípravku nižší než 15 °C nebo pokud je aktivita včelstva velmi nízká nebo pokud teplota přesahuje 40 °C.
Apitraz (amitraz)	1 000 mg	Proužek do úlu	na předpis	podletí	ne	Používat v době, kdy je málo plodu ve srovnání s jeho maximální úrovní; kromě toho, když jsou včely ještě aktivní, tj. před tím, než vytvoří zimní chomáč.
Apivar (amitraz)	1 000 mg	Proužek do úlu	na předpis	podletí, jaro	ne	Použití po posledním vytočení medu (koniec léta/podzim) a před začátkem jarní snůšky.
Dany's BienenWohl (kyselina šťavelová)	2 000 mg	Prášek a roztok pro disperzi do úlu	vyhrazený	celoročně spíše podzim a zima nebo ošetření rojů	ne	Použití ve včelstvech bez plodu, venkovní teplota nejméně 3 °C.
Formidol (kyselina mravenčí)	40 000 mg	Proužek do úlu	vyhrazený	od jara do podletí	ne	Nejlépe při denních teplotách nad 20 °C, a pokud rozdíl mezi denní a noční teplotou nejsou vysoké.
Formidol 81 g proužky do úlu (kyselina mravenčí)	80 000 mg	Proužek do úlu	vyhrazený	od jara do pouze podletí	ne	Zaměřeno zejména ochranu plodu, z kterého se líhne generace zimujících včel.

Gabon Flum (flumethrin)	8 mg	Proužek do úlu	na předpis	podletí	ne	Zaměřeno zejména na ochranu plodu, zakládajícího generace zimujících včel v podletí.
Gabon PF (fluvalinat)	180 mg	Proužek do úlu	na předpis	podletí	ne	Zaměřeno zejména na ochranu plodu zakládajícího generace zimujících včel v podletí.
M-1 AER (fluvalinat)	1 mg	Koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel	na předpis	podzimní a zimní aerosol, jarní nátěr plodu	ne	Použit v době, kdy jsou včelstva bez plodu nebo mají jen malou plochu zavíčkovaného plodu. Nepoužívá se v době od 16. dubna do 30. září
MP 10 FUM (fluvalinat)	1 mg	Roztok do úlu	na předpis	podzimní fumigace	ne	Použit v době, kdy jsou včelstva bez plodu nebo mají jen malou plochu zavíčkovaného plodu, nepoužívá se v době od 16. dubna do 30. září.
Oxuvar (kyselina šťavelová)	2 000 mg	Koncentrát pro kožní roztok	vyhrazený	celoročně spíše podzim a zima		Použití ve včelstvech bez plodu. Aplikace po kapkách musí být provedena v bezplodém včelstvu na podzim / v zimě, jednorázově a při venkovních teplotách mezi 5 °C a -15 °C. Aplikace aerosolem (na podzim / v zimě nebo na jaře / v létě) musí být provedena u bezplodých včelstev, jednorázově a při venkovních teplotách vyšších než 8 °C.
Oxybee (kyselina šťavelová)	2 000 mg	Prášek a roztok pro disperzi do úlu	vyhrazený	celoročně, spíše podzim a zima	ne	Použití ve včelstvech bez plodu, venkovní teplota nejméně 3 °C.
PolyVar Yellow (flumethrin)	550 mg	Proužek do úlu	na předpis	podletí	ne	Nutno zahájit krátce po velké snůšce a vytočení medu, aby byla zajištěna dostatečná letová aktivita, potřebná k dosažení léčebného účinku.
Thymovar, 15 g proužky do úlu pro včely (thymol)	30 000 mg	Proužek do úlu	vyhrazený	celoročně	ne	Pokud v průběhu léchy průměrná teplota klesne pod 15 °C, dochází ke snížení účinnosti přípravku. Nepoužívejte, pokud vnější teplota překročí 30 °C.

Varidol 125 (amitraz)	7 mg	Roztok k léčebnému ošetření včel	na předpis	podzimní fumigace zimní aerosol, po nátěru plodu	ne	V době, kdy jsou včelstva bez plodu nebo mají jen malou plochu zavíčkovaného plodu. Nepoužívat v době od 16. dubna do 30. září
VarroMed (kyselina šťavelová a mravenčí)	2 000 mg + 200 mg	Disperze do úlu	vyhrazený	celoročně - jaro, podzim, zima	ne	V zimě v období bez plodu jedno použití, na jaře a na podzim opakovaně.

Zdroj: ÚSKVBL; stav k 24. 7. 2019

Léčiva používejte vždy v souladu s příbalovou informací!